Observation d'un trepan fait au tibia par M. Serquin chirurgien Major de la Marine au port de Toulon, Lieutenant de M. le premier chirurgien du Roy et jnspecteur du college Royal de chirurgie.

Le Nommé jean pierre Bernard agé d'environ 26 ans forçat de la galere Brave N.° 16910. fut aporté à L'hopital de la marine Le 11. X.bre 1781. ayant eté blessé En travaillant à L'arrangement des bois par une tres grosse piece qui luy tomba sur la jambe droite; les tegumens et le perioste de sa partie anterieure et des tiers Moyen furent dechirés sans Lesion apparente à l'os: le gonflement, la fievre et des douleurs lancinantes dans L'interieur de l'os donnerent lieu à tous les antiphlogistiques internes et Externes possibles, aux incisions les plus Etendues et en tout sens des aponevroses et du perioste; la supuration s'etant legerement etablie, le gonflement diminua en partie, mais les douleurs surtout dans L'interieur de l'os etant continuelles, l'ulcere d'une sensibilité Extraordinaire, les jaunes d'œufs frais etoient les seuls topiques qui procuroient quelques minutes de soulagement, pour lors les douleurs interieures lancinantes devenoient gravatives pendant le peu de calme qu'il Eprouvoit.

quatre Mois de pansement varié, seconde de remedes internes s'etant ecoulés sans succés, l'ulcere etant toujours fongueux, ne donnant qu'une supuration ichoreuse me porterent à interroger le malheureux souffrant, il dit qu'il avoit reçu un coup de fusil dont la balle avoit traversé le gras de jambe; vers L'age de 20 ans, que trois ans aprés travaillant à une verrerie il reçut un coup tres violent sur la partie Moyenne de la meme jambe qui avoit resté longtems à guerir,

ARC 61 n° 71
ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

que cette playe s'etoit réouverte plusieurs foy, et qu'il avoit
ressenti du depuis des douleurs dans l'interieur de l'os plus
ou moins vives.

ayant reflechi sur les antecedents, nous nous determinames
a mettre la face interne de la partie moyenne du tibia —
a découvert et a la rugines, le 29 avril dernier, et quoique
la consistance de l'os n'annonçoit point le spina ventosa
nous appliquames le 30 une couronne de trepan: la piece d'os
qui etoit d'un compacte et d'une epaisseur extraordinaire
ayant eté enlevée, il se presenta a l'ouverture quelques goutes
de serosité rougeatre et une esquille d'os de la grosseur d'une
grosse lentille, mais ayant plusieurs angles, et successivement
deux autres plus considerables et irregulieres; demy heure
après l'operation les douleurs diminuerent et disparurent
comme par enchantement. le malade fut saigné deux fois —
dans les premieres 24. heures, l'ulcere se mit insensiblement
en supuration, son fond fut pansé avec la decoction de
quinquina, et les bords avec le digestif simple; une espece
de scarre noiratre qui couvroit le perioste interne s'etant
exfoliée, les chairs prirent une consistance louable et vers le
12.e jour après l'operation tout l'ulcere ne fut pansé qu'avec le
decoction de quinquina: le 18. et le 19. les bords furent touchés —
avec l'extrait de saturne et pansés a sec. le 21. et le 22 on y mit
de la limaille de cuivre pulverisée pour moderer les chairs. —
le 24 l'exphoilation de l'interieur de l'ouverture du trepan se
fit, cette cavité fut bientôt remplie d'une espece de substance
fongueuse qui devint dans peu de jours d'une consistance —
aussi ferme que le reste de l'os, difference bien grande de celle
qui arrive après le trepan aux os du crane. Le 18. juillet le
malade a eté entierement gueri quoiqu'il ne soit sorti de

L'hopital que le 17 aoust de cette année.

Les pieces fracturées dans l'interieur de l'os etoient elles dependantes du 1.er du 2.e ou du 3.e accident? c'est ce qu'on ne peut point déterminer, mais la cure n'est pas moins certaine.

à Toulon le 29. Xbre. 1782./

Jerquin

ACADEMIE NATIONALE DE [...]CINE

tirpor.

n.º 42.